



PRURIFEM®

KADEFARM

*aloes, cardiospermum,
olejek drzewa herbacianego,
witamina E*

Krem intymny pH 5,5

KOJĄCY KREM DO STOSOWANIA W OKOLICACH INTYMNYCH

Natychmiastowe działanie
przeciwswiądowe i przeciwbólowe.

Do stosowania zewnętrznego,
także u dzieci.

WSKAZANIA DO STOSOWANIA:

- profilaktycznie w przypadku suchości i dyskomfortu okolicy sromu, typowych dla okresu menopauzy,
- świąd, pieczenie, podrażnienie związane z infekcją skóry okolicy sromu i odbytu,
- profilaktycznie po leczeniu przeciwzapalnym pochwy i sromu oraz układu moczowego,
- wulwodynia i westybulodynia,
- uzupełnienie terapii dopochwowej,
- świąd odbytu spowodowany infekcją owsikiem.



**DO STOSOWANIA
ZEWNĘTRZNEGO**

www.kadefarm-zdrowie.pl



PRURIFEM®

KADEFARM

*aloes, cardiospermum,
olejek drzewa herbacianego,
witamina E*

Krem intymny pH 5,5

Prurifem® krem intymny pH 5,5 zawiera specyficzne składniki aktywne, które łagodzą świąd sromu i odbytu oraz wzmacniają funkcje ochronne skóry, minimalizując ryzyko podrażnień. Posiada fizjologiczne pH, stwarzające dogodne warunki do rozwoju i stabilizacji naturalnej flory sromu. Poziom pH odpowiedni również dla dzieci.

PACJENTKI Z DOLEGLIWOŚCIAMI OKOLIC INTYMNYCH:

- po leczeniu przeciwzapalnym,
- z podrażnieniami wynikającymi z dużej aktywności sportowej (w tym jazda na rowerze, pływanie czy częste kąpiele),
- ze skłonnością do częstych infekcji,
- w okresie menopauzy,
- stosujące antykoncepcję hormonalną.

U PACJENTÓW PEDIATRYCZNYCH:

- świąd i podrażnienia sromu u dzieci,
- świąd odbytu spowodowany infekcją owsikiem,
- zalecany w przypadku stulejki oraz zrostu mniejszych warg sromowych w okresie dziecięcym.

Nie zawiera środków znieczulających (lidokainy, benzokainy), parabenów, wazeliny, PEG, sterydów. Doskonale się rozprowadza i jest łatwo wchłaniany przez skórę. Nie pozostawia tłustej warstwy.

DAWKOWANIE:

Krem może być stosowany 3 – 4 razy dziennie.

U pacjentek z okresowymi dolegliwościami intymnymi, w celu złagodzenia świądu narządów zewnętrznych, 1 raz dziennie 4 razy w tygodniu, jako uzupełnienie terapii dopochwowej.

W terapii przewlekłej (np. w okresie menopauzy), na przemian, jeden dzień rano i wieczorem, drugi dzień tylko na noc.